

【化学療法を受けられる患者様用】

経過	治療前日	化学療法当日	退院日
日時	/	/	/
目標			
治療		医師が点滴をとります ※点滴刺入部の痛み・腫れなど違和感を感じた場合はすぐに看護師へお知らせください。	
内服薬	お薬の確認をします	薬剤師・看護師から翌日開始予定のお薬を説明しお渡しします	☆退院処方☆ <input type="checkbox"/> ナゼア <input type="checkbox"/> デカドロン <input type="checkbox"/> マグミット <input type="checkbox"/> シプロフロキサシン <input type="checkbox"/> ナウゼリン座薬
食事	制限はありません 	制限はありません 吐き気などにて食欲がないときには、お知らせください	
検温		点滴中は体温、血圧、脈拍数の測定を行います 	必要時に検温、血圧、脈拍数の測定を行います
保清	シャワー浴	抜針後、シャワー浴できます	制限はありません
説明指導	<input type="checkbox"/> 治療用パンフレットについて説明します <input type="checkbox"/> 外来化学療法室オリエンテーションについて説明、時間調整を行います	<input type="checkbox"/> 看護師、薬剤師より内服薬について説明があります <input type="checkbox"/> 治療中、点滴している部位に疼痛など異常があればすぐに報告してください <input type="checkbox"/> 治療中、治療後に副作用症状が出た場合には、遠慮なくお伝えください	☆シプロフロキサシンの内服方法☆ 38℃以上の発熱や37℃台後半が持続する場合は内服を開始し、途中で中断せずに全て飲みきってください。 ※シプロフロキサシンを2日間内服しても熱が下がらない場合は、病院へ連絡・受診してください。

